

Risikoprotokoll



Der
Weihnachtsmann
06.12.1946



Risiko 75+

Diagnosen: Hypertonie, Herzinfarkt, Zustand nach, Depression, Diabetes mellitus Typ 2, Hypercholesterinaemie, Gastritis, Bronchitis, akute, Husten

Beschwerden:  Gelenkschmerzen
Wohlbefinden: 

Allgemeine Anmerkungen/Hinweise:

Im Rahmen der umfassenden Medikationsanalyse zur Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit wurde die uns aktuell vorliegende Medikation inkl. Selbstmedikation des Patienten auf folgende arzneimittelbezogene Probleme geprüft:

- Dosierung und Einnahmezeitpunkte
- Anwendung und Handhabung
- Kontraindikationen und Anwendungsbeschränkungen (bzgl. vorliegender Diagnosen, Allergien und Risikofaktoren wie z.B. Eignung der Arzneimittel im Alter, Schwangerschaft oder Stillzeit)
- Nebenwirkungen (z.B. Können bestehende Beschwerden Nebenwirkungen der aktuellen Medikation sein?)
- (Pseudo-)Doppelterordnungen
- klinisch relevante Interaktionen

 = RX (verschreibungspflichtig)

 = BTM (Betäubungsmittel)

 = OTC (in Apotheken frei verkäuflich)

 = Plasmaspiegelveränderung

 = Nebenwirkung

 = Kontraindikation

 = Wechselwirkung

Risikoprotokoll

Medikamente

ARZNEIMITTEL	EMPFEHLUNG
 Hustenstiller ratio DMP Kapseln 30mg, Kps 10 Stück	Darf nicht gleichzeitig mit Jatrosom eingenommen werden. Alternativer Hustenstiller z.B. Phytohus-til, Quimbo Tropfen (Apotheke)
 Jatrosom 20mg Filmtabletten 20mg, FTbl 50 Stück	
 Januvia 100mg Filmtabletten 100mg, FTbl 28 Stück	
 Cefuroxim Puren 500mg Filmtabletten 500mg, FTbl 14 Stück	Nicht geeignet bei Pantoprazol-Einnahme. Wechsel des Antibiotikums, um Therapieversagen zu vermeiden, z.B.
 Rosuvastatin Heumann 5mg Filmtabletten 5mg, FTbl 100 Stück	
 Pantoprazol Basics 20mg Magensaftresistente Tabletten 20mg, TblM 90 Stück	Indikation prüfen (Ärzt*in), wenn Einnahme weiterhin notwendig, Einnahmezeitpunkt anpassen
 Metformin - CT 1000mg Filmtabletten 1000mg, FTbl 180 Stück	

Indikation und Einnahme 1

ARZNEIMITTEL	EINNAHME/ANWENDUNG	BESCHREIBUNG	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG	AKTION	OPTIMIERUNG DURCH
Pantoprazol Basics 20mg Magensaftresistente Tabletten 20mg, TblM 90 Stück	Patient: nach dem Essen Optimiert: mindestens eine Stunde vor dem Essen	megensaftresistente Arzneiform, Einnahme 1 Stunde vor dem Essen, um Wirkung sicherzustellen	Wenn dieses Arzneimittel weiterhin eingenommen werden soll, muss es 1 Stunde vor dem Essen eingenommen werden	Patient informieren	Apotheker

Risikoprotokoll

Symptomatische Nebenwirkungen

3

NEBENWIRKUNG  Gelenkschmerzen	WIRKSTOFF Tranylcypromin selten Pantoprazol selten Sitagliptin möglich Rosuvastatin sehr selten	BESCHREIBUNG Der Patient leidet seit ca. 6 Monaten an Gelenkschmerzen. Neben einer neuen Grunderkrankung könnten auch die hier aufgeführten Arzneimittel ursächlich sein. (Vgl. Nebenwirkungen Arthrose und Arthropathie unter Sitagliptin).	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG Bitte um Prüfung des Kausalzusammenhangs und weiterer Diagnostik.	AKTION Arzt informieren	OPTIMIERUNG DURCH Apotheker
NEBENWIRKUNG  Arthrose	WIRKSTOFF Sitagliptin möglich	BESCHREIBUNG Vgl. Gelenkschmerzen	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG	AKTION	OPTIMIERUNG DURCH
NEBENWIRKUNG  Arthropathie	WIRKSTOFF Sitagliptin möglich	BESCHREIBUNG Vgl. Gelenkschmerzen	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG	AKTION	OPTIMIERUNG DURCH

Wechselwirkungen

7

RELEVANZ/HÄUFIGKEIT gefährlich, wahrscheinlich	ARZNEIMITTEL Hustenstiller ratio DMP Kapseln Jatrosom 20mg Filmtabletten	BESCHREIBUNG Verstärkung zentraler Nebenwirkungen, Sertonin-Syndrom, 14-Tage Abstand	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG Kombination kontraindiziert, Substitution empfohlen: Alternativer Hustenstillter, z.B. Phytohostil oder Quimbo.	AKTION Patient informieren	OPTIMIERUNG DURCH Apotheker
RELEVANZ/HÄUFIGKEIT bedeutsam, wahrscheinlich	ARZNEIMITTEL Cefuroxim Puren 500mg Filmtabletten Pantoprazol Basics 20mg Magensaftresistente Tabletten	BESCHREIBUNG Cefuroxim-Resorption vermindert, Therapieerfolg gefährdet	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG Kombination aus Sicherheitsgründen und/oder mangels Erfahrung nicht empfohlen, Substitution empfohlen: indikationskonformer Austausch des Antibiotikums, z.B. gegen Cephalosporine, deren Resorption nicht durch einen Anstieg des Magen-pH-Wertes beeinflusst wird: Cefalexin (1. Generation), Cefixim (3. Generation), Penicilline wie z.B. Amoxicillin und andere Penicilline bei Verträglichkeit, Makrolide wie z.B. Clarithromycin	AKTION Arzt informieren	OPTIMIERUNG DURCH Apotheker
RELEVANZ/HÄUFIGKEIT bedeutsam, möglich	ARZNEIMITTEL Metformin - CT 1000mg Filmtabletten Pantoprazol Basics 20mg Magensaftresistente Tabletten	BESCHREIBUNG Risiko für Vitamin B12-Mangel v.a. bei Langzeittherapie und Risikofaktoren	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG Kombination mit Vorsicht, bei Langzeittherapie Vitamin B12-Spiegel bestimmen, ggf. Vitamin B12 substituieren	AKTION Arzt informieren	OPTIMIERUNG DURCH Apotheker
RELEVANZ/HÄUFIGKEIT bedeutsam, möglich	ARZNEIMITTEL Januvia 100mg Filmtabletten Jatrosom 20mg Filmtabletten	BESCHREIBUNG blutzuckersenkende Wirkung verstärkt, Risiko für Hypoglykämie erhöht	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG Kombination bei Monitoring (regelmäßige Blutzuckerkontrolle), ggf. Dosisanpassung Patient für Symptome einer Unterzuckerung sensibilisieren	AKTION Patient informieren	OPTIMIERUNG DURCH Apotheker
RELEVANZ/HÄUFIGKEIT bedeutsam, möglich	ARZNEIMITTEL Metformin - CT 1000mg Filmtabletten Jatrosom 20mg Filmtabletten	BESCHREIBUNG blutzuckersenkende Wirkung verstärkt, Risiko für Hypoglykämie erhöht	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG siehe VW Sitagliptin+Jatrosom	AKTION Patient informieren	OPTIMIERUNG DURCH Apotheker

Risikoprotokoll

RELEVANZ/HÄUFIGKEIT bedeutsam, sehr häufig	ARZNEIMITTEL Alkoholisches Getraenk Lsg Jatrosom 20mg Filmtabletten	BESCHREIBUNG Alkohol-Abbau gehemmt, Bluthochdruckkrise durch Sympa- thomimetika in Alkoholika	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG Alkoholkonsum in großen Mengen vermeiden, kein Konsum von mit Hefen durch Gärung hergestellte Getränke (Bier, Wein, Sekt, Schaumwein, auch alkoholfreie Sorten) und hochprozentige alko- holische Getränke	AKTION Arzt informieren	OPTIMIERUNG DURCH Apotheker
RELEVANZ/HÄUFIGKEIT gefährlich, sehr häufig	ARZNEIMITTEL Tyramin-haltige Nahrung Port Jatrosom 20mg Filmtabletten	BESCHREIBUNG Blutdruckanstieg durch Tyramin, Bluthochdruckkrise	OPTIMIERUNGSVORSCHLAG keine tyraminhaltigen Lebensmit- tel konsumieren. Siehe ausge- hängigte Liste. Keine Walnüsse, Nougat oder Bitterschokolade von den Geschenken der Kinder naschen	AKTION Patient informieren	OPTIMIERUNG DURCH Apotheker
